

SERPIENTES DE CASCABEL EN ARIZONA

Arizona cuenta con la población más diversa de serpientes de cascabel, con aproximadamente 15 especies diferentes en el estado. La serpiente de cascabel diamante occidental es la más común. Otras especies comunes incluyen la serpiente de cascabel de Mojave y la serpiente de cascabel cornuda.

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS

Las serpientes de cascabel se pueden distinguir de otras serpientes por características que incluyen:

- Una cabeza triangular
- Pupilas elípticas, parecidas a las de un gato
- Fosas loreal o sensibles al calor entre las fosas nasales y los ojos
- Un cascabel al final de la cola

COMPORTAMIENTO DE LAS SERPIENTES DE CASCABEL

- Más activas durante los meses más cálidos del año, temprano por la mañana y al final de la tarde/noche.
- Camuflarse bien en su entorno.
- No siempre hace sonar el cascabel antes de morder
- Puede atacar hasta la mitad de la longitud de su cuerpo.
- No perseguirán a la gente. En cambio, intentarán alejarse.

En general, las serpientes de cascabel no son agresivas. Evitan interactuar con los humanos y no buscan morderlos, pero lo hacen si se les provoca o si perciben peligro.

LLAME AL CENTRO DE ENVENENAMIENTO PARA:

- Tratamiento de intoxicaciones
- Mordeduras y picaduras
- Plantas venenosas
- Preguntas sobre medicina
- Intoxicación alimentaria
- Información sobre pesticidas
- Exposiciones en el lugar de trabajo
- Eliminación de materiales peligrosos
- Reacciones a medicamentos y productos químicos
- Exposiciones durante el embarazo y la lactancia
- Envenenamientos de animales
- Información sobre la prevención de intoxicaciones
- Programas educativos

NUESTROS SERVICIOS:

- Disponible 24/7/365
- Completamente gratuito y confidencial
- Disponible en varios idiomas


PARA MÁS INFORMACIÓN:

 **1-800-222-1222**

 **AZPOISON.COM**

 **www.facebook.com/AZPDIC**

 **@azpoisoncenter**



SEGURIDAD SOBRE LAS SERPIENTES DE CASCABEL

ARIZONA
Poison and Drug
Information Center



 **1-800-222-1222**

ESTADÍSTICAS DE MORDEDURAS DE SERPIENTES DE CASCABEL

El Centro de Envenenamiento de Arizona se especializa en el tratamiento de mordeduras de serpiente de cascabel. Arizona registra el mayor número de mordeduras de serpiente de cascabel per cápita al año en comparación con otros estados. Anualmente, nuestro centro atiende cerca de 200 mordeduras de serpiente de cascabel.

En Arizona, la temporada de serpientes de cascabel ocurre de abril a octubre.

- La mayoría de las picaduras ocurren entre las 4 p.m. y las 10 p.m., coincidiendo con la parte más fresca del día durante los meses más cálidos.
- La mayoría de las mordeduras ocurren en un lugar de residencia.
- Las circunstancias comunes en las que las personas son mordidas incluyen:
 - Mientras hace jardinería o trabajos en la yarda
 - Meter la mano en algo (arbusto, cobertizo, etcétera)
 - Sacando la basura
 - Saliendo de un vehículo o de la casa



CÓMO PREVENIR UNA MORDEDURA DE SERPIENTE

- Mantenga las manos y los pies fuera de espacios reducidos.
- Instale luces alrededor de su casa y a lo largo de los pasillos.
- Utilice linternas mientras camina al aire libre cuando está oscuro afuera.
- Evite manipular serpientes
- Tome medidas para mantener las serpientes de cascabel alejadas de su hogar
 - Mantenga la yarda bien cuidada
 - Retire pilas de piedras, troncos y escombros.
 - Eliminar fuentes de agua
 - Controlar las poblaciones de roedores

¿QUÉ HACER EN CASO DE MORDEDURA?

- Vaya al hospital inmediatamente. El antiveneno de serpientes, necesario para tratar las mordeduras de serpiente de cascabel, solo está disponible en hospitales.
- Incluso si la mordedura parece normal, el veneno puede aumentar el riesgo de sangrado. Para evaluar esto, se requieren análisis de laboratorio en un hospital de inmediato.
- Quítese las joyas, la ropa ajustada y los zapatos cerca de la mordedura.
- NO corte ni intente succionar el veneno.
- NO utilice torniquetes ni vendajes apretados
- No es necesario identificar el tipo de serpiente de cascabel para recibir tratamiento

EFFECTOS FÍSICOS DE UNA MORDEDURA DE SERPIENTE DE CASCABEL

- Las lesiones locales incluyen: dolor, hematomas, ampollas, hinchazón y daño tisular.
- El veneno puede afectar la capacidad de la sangre para formar coágulos, lo que aumenta el riesgo de sangrado.

COSTOS DE SER MORDIDO

Ser mordido por una serpiente de cascabel puede ser costoso, no solo financieramente, sino también en otros aspectos, ya que los efectos de una mordedura de serpiente de cascabel pueden ser duraderos y afectar varios aspectos de la vida diaria.

COSTOS FINANCIEROS

El costo total del tratamiento de una mordedura de serpiente de cascabel puede superar los \$100,000. Esto incluye el costo del antiveneno, análisis de laboratorio, medicamentos y otros gastos asociados con la hospitalización.

COSTOS FÍSICOS

Los pacientes pueden experimentar dolor, debilidad muscular, pérdida o limitación de la función, hinchazón y entumecimiento que pueden durar al menos de 3 a 6 meses después de la mordedura.

COSTOS DE OPORTUNIDAD

Los pacientes podrían tener que tomar tiempo extendido fuera del trabajo o tener que volver al trabajo y superar síntomas como el dolor. Dependiendo de la gravedad de la mordedura, algunos pacientes podrían no poder regresar al trabajo o tener que cambiar de trabajo.